



มาตรการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาด โรคติดต่อทางยุงลาย



โรคไข้เลือดออก เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเดงกี มียุงลาย เป็นพาหะนำโรค พบได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ อาการที่พบ ได้แก่ ปวดศีรษะรุนแรง ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ปวดข้อหรือกระดูก ปวดกระบอกตา หรือมีผื่น อาจมีอาการเลือดออก เช่น เลือดกำเดาไหล เลือดออกตามไรฟัน มีจ้ำเลือด อาเจียนเป็นเลือด ปัสสาวะเป็นเลือด ถ่ายเป็นสีดำ เลือดออกทางช่องคลอด ผิดปกติ หรือดับโต



มาตรการรณรงค์ปลอดโรคไข้เลือดออก

✓ ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข เพิ่มความเข้มข้นในการสำรวจ และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และจัดกิจกรรมรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์ (หยอดทรายอะเบท) ตามมาตรการ 3 เก็บ

1. เก็บบ้าน ให้สะอาด ปลอดโปร่ง ไล่สวะสะอาด ไม่เป็นที่เกาะพักของยุงลาย
2. เก็บขยะ เศษภาชนะ ที่อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย
3. เก็บน้ำ ให้มิดชิด ปิดฝา หากปิดฝาไม่ได้ให้ทากความสะอาดภาชนะทุก 7 วันและ
ใส่ทรายอะเบท โดยใช้อัตราส่วน 1 กรัมต่อน้ำ 10 ลิตร

✓ กรณีเกิดเดสไข้เลือดออก **ภายใน 3 ชั่วโมงแรก** หลังได้รับรายงาน รพ.สต. สอบสวนโรค และ อสม. ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และฉีดสเปรย์กระพือกำจัดยุงในบ้าน ผู้ป่วย และประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 1 วันหลังได้รับรายงาน พันสารเคมีกำจัดยุง ที่บ้านผู้ป่วยและบ้านที่อยู่**ในรัศมี 100 เมตร** จากบ้านผู้ป่วย ทั้งในและนอกบ้าน และจุดที่สงสัยเป็นแหล่งโรค ตามมาตรการ 1-3-7

ด้วยความปรารถนาดีจาก อบต.แม่่นาจร

ข้อมูลอ้างอิงจาก : กองโรคติดต่อทางแมลง กรมควบคุมโรค

โปรดอย่าลืม!!!

- ✓ ใส่เสื้อผ้ามิดชิด
- ✓ ทาโลชั่นกันยุง
- ✓ นอนในมุ้ง



โรคไข้เลือดออก



โรคภัยที่มีユงเป็นพาหะ

โรคไข้เลือดออก

โรคไข้เลือดออกที่พบในไทย เกิดจากเชื้อไวรัส เดงกี มีユงลายเป็นพาหะนำโรค พบได้ทั้งในเด็ก และ ผู้ใหญ่ เชื้อไวรัสนี้มี 4 ชนิด ผู้ที่เคยเป็นแล้วสามารถ ติดเชื้อซ้ำได้ ถ้าได้รับเชื้อต่างกัน หากผู้ป่วยมีอาการ ไม่ดีขึ้นภายใน 2-3 วันควรไปพบแพทย์

อาการ



ไข้สูง 39-40 องศา
ประมาณ 2-7 วัน
ปวดเมื่อยตามตัว ตาม
ศีรษะ



อาการเลือดออก
ตามงา อาเจียน



ตัวโต
มักกดเจ็บบริเวณ
ชายโครงข้างขวา



ระบบหมุนเวียน
เลือดผิดปกติ
หรือมีภาวะช็อก



บางรายอาจพบ
อาการรุนแรง
เช่น ไตวาย

การรักษา



การลดไข้
พาราเซตามอล



ดื่มน้ำให้เพียงพอ



สังเกตอาการอย่าง
ใกล้ชิด

การป้องกัน



ทำอาอหรงเพาะพันตู้สูงลาอ

พบนสารเคมีทำลายลูกน้ำและสูง
ตัวเต็มวัย



สวมเสื้อแขนยาวและ
กางาโลอัมกับสูง